

### De controle

Controle is alleen nodig als u klachten heeft, of wanneer u opnieuw gespoten wil worden.

### Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de poli Chirurgie, telefoon: 0495 - 57 22 76.

Buiten kantooruren kunt u voor dringende vragen terecht bij de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoon: 0495 - 57 26 10.



# Scleroseren van spataderen

Poli Chirurgie / Flebologie

R330.60 2012-01

1076032

Vogelsbleek 5  
6001 BE Weert  
T. 0495 - 57 21 00  
[www.sjgweert.nl](http://www.sjgweert.nl)

## **Wat is scleroseren?**

Scleroseren is het inspuiten van spataders met een vloeistof. Deze vloeistof veroorzaakt een onschuldige ontstekingsreactie aan de binnenkant van de ader. Door deze ontsteking gaat de aderwand verkleven. De ader wordt dichtgedrukt en wordt na verloop van tijd onzichtbaar.

## **Wat mag u van de behandeling verwachten?**

Afhankelijk van de omvang en de oorzaak van de spataderen zal een behandeling meer of minder succesvol zijn. Bij de ene patiënt zijn de spataderen snel terug, bij de andere blijven ze 10 jaar of langer weg. De neiging om spataderen te krijgen wordt door de behandeling niet weggenomen.

## **De behandeling**

De behandeling gebeurt poliklinisch op de poli Flebologie.

Tijdens de behandeling ligt u, op een behandeltafel.

De spatader wordt met een naaldje aangeprikt. Dit prikken is vrijwel pijnloos. Hierna wordt deze met een vloeistof ingespoten. Door dit inspuiten ontstaat een ontstekingsreactie aan de binnenkant van de ader. Dit geeft in het algemeen weinig klachten. Deze reactie heeft weinig bijwerkingen voor de rest van het lichaam.

Na de behandeling wordt het been ingepakt met een zelfklevende zwachtel (pleisterverband).

## **Mogelijke complicaties of bijwerkingen**

Het is normaal dat er, tijdelijk, in de gespoten aders stolsels ontstaan. Deze zijn soms pijnlijk maar trekken na verloop van tijd altijd weg.

Uiterts zeldzame bijwerkingen zijn necrose en trombose.

Soms kunt u na het inspuiten een bruine verkleuring van de huid hebben. Deze verkleuring trekt niet altijd volledig weg.

Slechts zelden treedt een overgevoeligheidsreactie op.

Komt de vloeistof naast de ader terecht of lekt het uit een zwakke ader, dan kan de huid plaatselijk stuk gaan. Ook kramp van kleine slagadertjes kan leiden tot het stuk gaan van de huid. Deze complicaties zijn niet altijd te voorkomen, hoe goed het inspuiten ook gebeurt. Ze komen echter heel weinig voor.

Het is verstandig telefonisch contact op te nemen met de poli Chirurgie als:

- U de eerste week last heeft van extreme pijn of ondraaglijke jeuk onder het verband.
- Het verband is doorgelekt door vocht of bloed vanuit het been.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp. De telefoonnummers staan op de achterzijde van de folder.

## **Vorbereiding**

- Draag ruimvallende en makkelijke kleding zodat er voldoende ruimte is voor het verband.
- Breng ruime schoenen mee waar uw voeten inpassen als deze in het verband zitten.
- Gebruik op de dag van de behandeling geen crème of bodylotion op de benen.
- Na de ingreep kunt u gewoon lopen, maar u mag niet zelf autorijden. Regel dus vervoer.

## **De nazorg**

Het na het spuiten aangebrachte pleisterverband mag u na 1 of 2 dagen verwijderen. Daarna draagt u nog 2 weken overdag steunkousen.

De behandelde plekken kunnen gevoelig zijn en beurs aanvoelen. Gedurende de dagen dat uw been gezwachteld is ondervindt u weinig beperkingen.

Doorgaans kunt u normaal uw werk doen.

Lopen is goed maar lang staan kunt u beter vermijden.

U kunt beter geen actieve sporten bedrijven.

Sauna en zonnebank wordt de eerste 2 - 3 weken afgeraden.