

Risico's en complicaties

Complicaties komen zeer zelden voor bij een gastroscopie.

Bij ernstige maagpijn of koorts na het onderzoek neemt u tot 17.00 uur contact op met de poli van de behandelend arts. Telefoon: 0495 – 57 26 26.

Buiten kantoor tijden neemt u contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp.

Telefoon: 0495 - 57 26 10.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen bespreek deze met uw arts of de endoscopieverpleegkundige. De endoscopieverpleegkundige is vanaf 8.00 uur bereikbaar via het Dagcentrum.

Telefoon: 0495 - 57 25 21



Gastroscopie

(onderzoek van slokdarm, maag en twaalfvingerige darm)

afdeling Endoscopie

U wordt op:

(datum)

om : **uur verwacht op het Dagcentrum (route 32) waar u zich meldt aan de balie**

Het onderzoek wordt verricht door:

(arts)

Binnenkort wordt u in het ziekenhuis verwacht voor een gastroscopie.

In deze folder staat informatie over het onderzoek.

Wat is een gastroscopie?

Een gastroscopie is een endoscopisch onderzoek van de slokdarm, maag en stukje twaalfvingerige darm.

Endoscopie betekent 'van binnen bekijken'. De arts bekijkt uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm van de binnenkant. Dit gebeurt met een flexibele en bestuurbare slang, een zogenaamde endoscoop, die een soort videocamera op de top heeft. De endoscoop heeft een doorsnede van 1 cm. De slang bevat kanalen die o.a. licht en beeld doorgeven.

De arts kan tijdens het onderzoek bepaalde afwijkingen, zoals ontstekingen, zweertjes, bloedinkjes, poliepen en gezwellen direct zien. Het is ook mogelijk via de endoscoop kleine ingrepen uit te voeren. De arts kan b.v. stukjes weefsel weghalen voor nader onderzoek (biopsie), of een bloeding stelpen.

Hoe bereidt u zich voor?

Voor het slagen van dit onderzoek is het van groot belang dat uw maag en twaalfvingerige darm leeg zijn. Daarom dient u voor dit onderzoek nuchter te zijn. Dit betekent dat u gedurende een bepaalde periode niets mag eten en drinken.

Indien het onderzoek plaatsvindt:

- **vóór 12.00 uur** mag u tot 4 uur voor het onderzoek nog 2 beschuiten met boter, jam en thee gebruiken. Daarna moet u nuchter blijven.
- **ná 12.00 uur** mag u tot 8.00 uur normaal ontbijten en eventueel 4 uur voor het onderzoek nog 1 beschuit met jam en thee. Daarna nuchter blijven.

Gedurende het nuchter blijven mag u wel de mond spoelen. U mag de vloeistof niet doorslikken. Heeft u toch wat doorgeslikt zeg dit, voorafgaande aan het onderzoek aan de verpleegkundige.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek wordt verricht door een arts, daarbij geassisteerd door een endoscopieverpleegkundige. Het onderzoek vindt plaats op de endoscopiekamer.

De verpleegkundige geeft u voor en tijdens het onderzoek informatie en instructies.

Het is niet nodig maar indien u dit wenst en u bent niet overgevoelig voor Xylocaine, kan een keelverdooving gegeven worden d.m.v. een keelspray (u mag dan 1½ uur na het onderzoek niet eten en niet drinken i.v.m. verslikingsgevaar.)

U neemt plaats op de rand van de onderzoekstafel. Om het onderzoek niet te belemmeren en beschadiging van het gebit te voorkomen, doet u een eventuele gebitsprothese uit.

U gaat op uw linkerzijde liggen, de knieën opgetrokken en de kin op de borst.

Tenslotte krijgt u een bijtring in de mond ter bescherming van uw tanden en de slang.

Het onderzoek begint met het inbrengen van de buigzame onderzoeksslang. Hierbij is het belangrijk dat u de instructies goed opvolgt. Het doorslikken en verschuiven van de slang is onprettig maar niet pijnlijk. Het onderzoek verloopt het beste als u zich ontspant en rustig door blijft ademen. De endoscoop belemmert uw ademhaling niet.

De arts zal de slokdarm, maag en een stukje van de twaalfvingerige darm van de binnenkant bekijken. De endoscoop wordt, met kleine stukjes, voorzichtig opgeschoven. Tijdens het onderzoek kan de arts lucht in de maag blazen, hierdoor krijgt u mogelijk een opgeblazen gevoel en neiging tot opboeren. Dit is een normale reactie.

Het is mogelijk dat de arts weefsel wegneemt voor onderzoek. Deze handeling kan gevoelig zijn maar is niet pijnlijk.

Het onderzoek duurt ± 5 minuten. In een aantal gevallen kan de arts u direct na het onderzoek de uitslag vertellen. Wanneer weefselonderzoek plaatsvindt kan de uitslag pas na een week gegeven worden.

De arts maakt dan een afspraak met u.

Na het onderzoek

Na het onderzoek is uw keel waarschijnlijk wat gevoelig, vooral bij hoesten. Dit gaat vanzelf over.

Als gevolg van de lucht die tijdens het onderzoek is ingeblazen, kunt u een opgeblazen gevoel hebben. Opboeren en/of winden laten geven verlichting.

Na het onderzoek mag u naar huis of terug naar de afdeling. U mag eten en drinken zoals u voor het onderzoek gewend was, tenzij u een keelverdooving heeft gehad, of de arts anders voorschrijft.