

Implantaten... natuurlijk!

Ik mis meerdere tanden en/of kiezen

Poli Mondziekten, Kaak- en Aangezichts chirurgie

Het verliezen van één of meer tanden of kiezen kan gevolgen hebben voor uw zelfvertrouwen. Misschien lacht u wel met een hand voor uw mond omdat u denkt dat iedereen het ziet of praat u minder makkelijk. Misschien kunt u niet zo goed meer kauwen en eet u niet meer alles wat u zou willen.

Als u één, meerdere of zelfs al uw tanden en kiezen mist en weer ongehinderd wilt kunnen praten, lachen en eten wat u lekker vindt, dan kunnen implantaten de oplossing voor u zijn.

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak wordt geplaatst. Deze permanente vervanging van de natuurlijke tandwortel dient als nieuw stevig fundament voor een kroon, brug of kunstgebit. De meeste implantaten zien eruit als een schroefje en zijn gemaakt van titanium, een lichaamsvriendelijk materiaal waar bot aan hecht.

Kan het ook bij mij?

Bij iedere volwassene kan in principe een implantaat worden geplaatst. Wel is voldoende kaakbot nodig om een implantaat te kunnen plaatsen. Waar te weinig is, kan meestal met een extra behandeling nieuw bot worden geplaatst.

Wanneer u nog eigen tanden en kiezen heeft, is het verder van belang dat het tandvles hieromheen gezond is. Als dit niet zo is moet daar eerst iets aan worden gedaan.

Inspectie van uw mond en analyse van bij u te maken röntgenfoto's zullen duidelijk maken of implantaten bij u kunnen worden toegepast.

Hoe groot is de kans van slagen?

Zeer groot. Goed onderzoek vooraf maakt de kans op complicaties of mislukkingen minimaal. Toch kan er direct aansluitend aan het plaatsen van een implantaat tijdelijk ongemak zijn in de vorm van napijn of zwelling. Soms groeit een implantaat niet goed vast en moet dan verwijderd worden. De kans hierop wordt groter als u rookt.

Wat mag ik verwachten?

Het uiteindelijke resultaat oogt en voelt zo natuurlijk dat u haast zou vergeten dat u ooit een tand of kies verloor!

Maar... ook met implantaten blijft goede dagelijkse mondhygiëne en regelmatig bezoek aan uw tandarts belangrijk. Net als met uw eigen tanden en kiezen. Niet meer en niet minder.

Als u meerdere tanden en/of kiezen mist, is een brug op implantaten vrijwel altijd de beste oplossing. Het resultaat ziet eruit en voelt als uw eigen tanden.

Wat zijn de voordelen van een brug op implantaten ten opzichte van gewone brug of een frame prothese?

Het grote voordeel van implantaten is, dat de behandeling zich beperkt tot waar het probleem zich voordoet. Implantaten vervangen alleen ontbrekende tanden of kiezen zonder dat andere tanden of kiezen bij de oplossing van het probleem worden betrokken.

Met een gewone brug moeten tanden of kiezen naast de ontbrekende worden beslepen. Met een brug op implantaten niet. Uw eigen tanden of kiezen worden gespaard, een enorm voordeel op lange termijn voor uw mond in z'n geheel!

Met een gewone brug worden alleen tanden en/ of kiezen vervangen en niet ook wortels. Het bot dat rondom de verwijderde wortels aanwezig was, zal op den duur slinken. Dit kan resulteren in een zichtbaar defect.

Implantaten vervangen niet alleen tanden en kiezen maar ook wortels. De contour van de kaak en het tandvlees blijven daardoor beter intact.



Ook na jaren zal niemand kunnen zien dat het niet uw eigen tanden en/of kiezen zijn.

Frameprotheses zijn uitneembaar en zullen altijd minder comfortabel zijn. Kauwen van voedsel gaat minder makkelijk. Een implantaatbrug zit vast in uw mond en u kunt er mee eten wat u wilt.

Hoe worden de implantaten geplaatst?

Eerst worden onder plaatselijke verdoving de implantaten in uw kaakbot geplaatst. In de daaropvolgende 2-6 maanden hecht het kaakbot zich aan de implantaten ("osseointegratie") en ontstaat het stevige fundament voor uw toekomstige nieuwe tanden en/of kiezen.

Tijdens de tweede stap in de behandeling worden de implantaten vrijgelegd en voorzien van opbouwen, die door het tandvlees steken en dienen als basis voor uw nieuwe tanden en/of kiezen.

Afhankelijk van uw specifieke situatie kunnen beide stappen van de behandeling worden samengevoegd tot één en zal de inhelingstijd nauwkeurig kunnen worden vastgesteld.

Tenslotte wordt de brug vervaardigd en vastgezet op de opbouwen. De totale behandeling heeft dan 3-9 maanden geduurd. Gedurende deze periode mag een tijdelijke tandvervangning worden gedragen.



Succesvol implanteren kan alleen als voldoende bot aanwezig is op de juiste plek.

Waarom is er soms niet genoeg bot?

In de bovenkaak achter de hoektanden is dikwijls van nature weinig bot aanwezig. Ook als gevolg van chronische ontstekingen aan uw tandvles, het trekken van tanden en kiezen of een ongeval blijft soms te weinig bot over. Het langdurig dragen van een slecht passend kunstgebit veroorzaakt eveneens botverlies.

Wat heeft dit tot gevolg?

Gebrek aan voldoende bot op de juiste plek zorgt niet alleen voor problemen bij het plaatsen van een implantaat maar betekent vooral dat het uiteindelijke resultaat er niet mooi uit zal zien.

Een voorwaarde voor een stralende glimlach is het herstellen van een goede contour van het kaakbot.

Wat is eraan te doen?

Met verschillende technieken kan bot dat verloren is gegaan worden teruggewonnen. Met behulp van uw eigen bot en/of botsubstituten wordt de kaak weer opgebouwd.

Na 6-12 maanden is het bot voldoende ontwikkeld en kunnen de implantaten worden geplaatst.

Afhankelijk van uw specifieke situatie kan het opbouwen van het bot en het plaatsen van de implantaten tegelijkertijd worden gedaan.

Na de behandeling

De behandeling zelf is misschien oncomfortabel, maar niet pijnlijk. De klachten na de behandeling zijn meestal beperkt en duren enkele dagen, maximaal een week.

De klachten kunnen zijn:

- een pijnlijk wondgebied in de mond
- enige zwelling
- eventueel een bloedingstorting.
- Bij behandelingen in de onderkaak verandert soms het gevoel in de lip of kin, dit is bijna altijd van tijdelijke aard.

De wond wordt gehecht met een materiaal dat na één tot twee weken oplost en spontaan verdwijnt. Vaak worden de hechtingen tijdens de controle verwijderd.

Thuis

U kunt vaak zelf naar huis rijden, soms is het prettig als u iemand meebrengt.

U krijgt:

- Een recept mee voor pijnstillers. Gebruik deze pijnstillers volgens voorschrift.
- Instructies om te koelen (om eventuele zwelling tegen te gaan).
- Eventueel instructies om de mond te spoelen.

U mag pas eten als de verdoving is uitgewerkt. Omdat u geen gevoel heeft in uw mond, kunt u op uw wang of tong bijten.

Het eten mag de eerste tijd niet te hard of te heet zijn (afhankelijk van uw klachten).

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen neem dan contact op met de poli Mondziekten, Kaak en Aangezichts chirurgie.

Telefoon: 0495 - 57 28 60

Deze folder is gebaseerd op informatie van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).

De NVOI is een wetenschappelijke vereniging die tot doel heeft het bevorderen en verbreiden van kennis van de orale implantologie en het dienstbaar maken van deze kennis aan de praktijk, de volksgezondheid en het onderwijs.

Voor meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen: www.nvoi.nl

R6366.10 2011-06

1206612

