

Wortelpuntoperatie

Poli Mondziekten, Kaak- en Aangezichts chirurgie

Route 72



Bij u is net een wortelpuntoperatie uitgevoerd. De aan de wortelpunt aanwezige ontsteking is weggenomen. In deze folder vindt u informatie over de mogelijke gevolgen van deze behandeling en de richtlijnen waar u zich aan moet houden.

Na de behandeling

Nadat de plaatselijke verdoving is uitgewerkt, kunt u pijn hebben. Ook is het mogelijk dat uw wang dik wordt en dat u koorts krijgt. U hoeft zich hier niet ongerust over te maken. Vooral de eerste drie dagen na de behandeling kunt u last hebben van deze klachten, daarna verdwijnen ze geleidelijk. De wond is gehecht met oplosbaar materiaal. Dit is na ongeveer anderhalve week verdwenen.

U krijgt een recept mee voor een pijnstillend middel, dat u zonodig kunt gebruiken.

Vaak is de behandelde kies of tand voorzien van een noodvulling; dit is u dan verteld door de kaakchirurg tijdens de behandeling. Nadat de wond genezen is, moet uw eigen tandarts deze vervangen door een blijvende vulling. Als het mogelijk is, moet dit binnen een maand gebeuren. U wordt verzocht hier zelf bij uw eigen tandarts een afspraak voor te maken.

Mondverzorging

Voor een goede wondgenezing is het belangrijk dat u uw mond vanaf de dag na de behandeling goed schoonhoudt. Dit bereikt u door uw kiezen en tanden goed te poetsen. Poets minstens na elke maaltijd en s avonds voor het slapen gaan. Daarnaast raden wij u aan te spoelen met lauw zout water; één flinke theelepel zout op 1 glas water (minimaal 1 keer per dag). Zout heeft een zuiverende werking. Hiermee kunt u één dag na de behandeling beginnen.

Wat u verder nog moet weten

- Pas op met hete dranken en warm voedsel gedurende de eerste dag van de behandeling. U zou uw mond anders ongemerkt kunnen branden of er kan een nabloeding optreden.
- U wordt verzocht de eerste vijf dagen na de behandeling niet te roken. Roken heeft een nadelige invloed op de wondgenezing.

- Om na de behandeling zwelling van de wang te voorkomen, kunt u een plastic zakje met fijn gemaakt ijs of een koelelement twintig minuten tegen de wang houden. Leg dit zakje niet rechtstreeks tegen de wang maar omwikkel het met bijvoorbeeld een doekje. Haal regelmatig de ijsblokjes van de wang.
- Als u na de behandeling moeite heeft met eten, raden wij u aan de eerste dagen vloeibaar en zacht voedsel te gebruiken. Geleidelijk kunt u dan weer uw normale eetpatroon oppakken.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis

Het spreekt vanzelf dat de arts alles in het werk zal stellen om complicaties tot een minimum te beperken. Toch bestaat er altijd een geringe kans op een nabloeding of een wondinfectie.

Neem contact op met de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschi-
rurgie als:

- de pijn, zwelling en slikklachten na twee dagen niet verminderen, of
- als er sprake is van koorts (boven de 39°C).

Tijdens kantooruren op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag de poli
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschi-
rurgie.

Bij vragen en/of problemen telefoon: 0495 - 57 28 64

Voor een afspraak (bellen tussen 08.30 – 16.30 uur),
telefoon: 0495 – 57 28 60

Overige tijden met de afdeling Spoedeisende Hulp
telefoon: 0495 – 57 26 10.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt kunt u die gerust stellen
aan uw behandelend arts.

