

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Longfunctie.

Telefoon: 0495 - 57 21 94



Histamine- provocatietest

Longfunctieafdeling
Route 60

**U wordt voor de Histamineprovocatietest
verwacht op**

Dag:

Datum:

Tijdstip:

R321.44 2011-08

1099929

Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
T. 0495 - 57 21 00
www.sjgweert.nl

De histamineprovocatietest

Dit is een onderzoek om verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van histamine, een lichaamseigen stof, waarmee de gevoeligheid van de luchtwegen gemeten kan worden.

De voorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn. Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Daarom is het belangrijk om op tijd te komen. Voor het goed slagen van de test dient u te stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen. Uw behandelend arts of de longfunctieanalist(e) zal u vertellen om welke medicijnen het gaat.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit u in een stoel en ademt via een mondstuk, dat verbonden is met een meetapparaat. Op de neus wordt een klemmetje geplaatst, om te voorkomen dat er lucht via de neus kan ontsnappen.

Bij het begin van de test zal de longfunctieanalist u vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen.

Daarna gaat u met tussenpozen verschillende histamine-concentraties inhaleren.

Na iedere verneveling wordt steeds weer het effect op de longfunctie gemeten. Aan de hand van de meetresultaten kan worden vastgesteld of astmatische klachten, zoals benauwdheid of hoesten, kunnen worden opgewekt.

Zodra er een benauwdheidsreactie optreedt, wordt er ingegrepen. U krijgt dan onmiddellijk een medicijn te inhaleren, waarmee de reactie vrijwel direct opgeheven wordt.

Het onderzoek wordt beëindigd als de longfunctie weer helemaal normaal is geworden.

Het totale onderzoek kan een uur in beslag nemen.

Na het onderzoek kunt u lichte keelpijn hebben of prikkelhoest. Het onderzoek is belastend vanwege het vele blazen, maar is verder niet gevaarlijk.

Medicatie tijdelijk stoppen

Voor het goed slagen van een test, dient men tijdelijk vóór het onderzoek, te stoppen met de inname van bepaalde medicatie. Deze kan namelijk invloed hebben op de onderzoeksresultaten.

1 week vóór het onderzoek niet meer innemen

- Aerius
- Allerfree
- Benylin
- Brontine
- Claritine
- Fexofenadine
- Hydroxozine
- Incidallette
- Multergan
- Phenergan
- Polaramine
- Polaronil
- Semprex
- Tavegil
- Telfast
- Terfenadine
- Toplexil
- Xyzal
- Zaditen
- Zyrtec
- Nedeltran
- Hismanal

48 uur voor het onderzoek niet meer innemen

- Spiriva
- Onbrez

24 uur voor het onderzoek niet meer innemen

- Foradil
- Oxis
- Seretide
- Serevent
- Symbicort
- Foster
- Atimos

12 uur voor het onderzoek niet meer innemen

- Aeromir
- Atrovent
- Berodual
- Berotec
- Bricanyl
- Combivent
- Ventolin

Verhinderd?

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Longfunctie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.