

Stereotactisch biopt

Poli Mammacare

Medische Beeldvorming
Route 22

R330.83 2011-08

1178189

Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
T. 0495 - 57 21 00
www.sjgweert.nl

Er is bij u een afwijking in de borst vastgesteld. De arts heeft in overleg met u besloten een stereotactische biopsie te laten doen.

Wat is een stereotactische biopsie?

Bij een stereotactische biopsie haalt de radioloog onder plaatselijke verdoving met een holle naald enkele stukjes weefsel uit de borst. Dit noemen we een biopsie. Deze stukjes weefsel worden onderzocht door de patholoog.

Wanneer de afwijking met behulp van echografie niet zichtbaar is wordt dit onder röntgengeleiding gedaan. Deze methode heet stereotactie.

Vorbereiding

Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt, meld dit dan op de Mammapoli. Het kan zijn dat deze tijdelijk gestopt moeten worden.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling Medische Beeldvorming (route 22).

Bij deze methode ligt u op uw buik op een speciale tafel. Uw borst komt in een uitsparing in de tafel te hangen. Onder de tafel wordt uw borst tussen twee plaatjes samengedrukt. In één van de plaatjes zit een opening waardoor de biopten worden genomen.

Het is belangrijk om zo stil mogelijk te blijven liggen zodat uw borst tijdens het onderzoek niet verplaatst.

Vervolgens worden er röntgenfoto's gemaakt om de plaats van de afwijking te bepalen. Daarna verdooft de radioloog deze plaats en maakt een klein sneetje in de huid en haalt met een holle naald enkele stukjes weefsel uit de borst.

Van deze weefselstukjes worden röntgenfoto's gemaakt. Daarna gaan deze stukjes naar het laboratorium van de patholoog.

Na het onderzoek

Er wordt een pleister geplakt op de plek in de huid waar de naald is binnengegaan.

Soms treedt er een onderhuidse nabloeding op. Dit ziet eruit als een blauwe plek die vanzelf wegtrekt.

De uitslag

Voor de uitslag van het onderzoek komt u na ongeveer een week terug op de Mammapoli. De afspraak hiervoor krijgt u van de mammacare verpleegkundige.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer een uur.

Pijn

De borst kan wat gevoelig zijn als de verdoving is uitgewerkt. Bij pijn mag u 2 tabletten Paracetamol á 500 mg gebruiken. U mag deze maximaal 4 maal daags innemen.

Contact opnemen

Neem bij: roodheid, zwelling van de borst of koorts contact op met de mammacare verpleegkundige, via de Mammapoli. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp. Telefoon: 0495 - 57 26 10.

Vragen

Bij vragen of problemen kunt u op werkdagen tussen 13.00 - 14.00 uur contact opnemen met de mammacare verpleegkundige op de Mammapoli. Telefoon: 0495 - 57 21 08.

Bij zaken die niet kunnen wachten kunt u op werkdagen de poli Chirurgie bellen. Telefoon: 0495 - 57 22 76.

Bij vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming. Telefoon: 0495 - 57 21 40.