

Heeft u nog vragen?

Bij vragen of problemen kunt u altijd contact opnemen met de mammacare verpleegkundigen op de Mammapoli. Zij zijn te bereiken via de volgende nummers:

- De mammacare verpleegkundige:
0495 – 57 21 08 tussen 13.00 uur – 14.00 uur.
- Poli Chirurgie bij zaken die niet kunnen wachten:
0495 – 57 22 76



Stereotactisch biopt

Mammapoli
Route 10

R330.82 2009-04

1178189

Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
T. 0495 - 57 21 00
www.sjgweert.nl

Er is bij u een afwijking in de borst gevonden. Om deze afwijking verder te onderzoeken bent u verwezen naar de afdeling Medische Beeldvorming voor een "stereotactisch biopt."

Inleiding

Om te bepalen wat de afwijking in uw borst is, wordt weefsel afgenomen (biopt) dat microscopisch wordt onderzocht. Dit gebeurt gewoonlijk met behulp van een punctie (prik) tijdens een echo onderzoek. Soms is een afwijking in een borst zo klein dat deze niet op de echografie te zien is of niet door middel van echografie kan worden aangeprikt. Dan wordt een stereotactische punctie (biopt) gedaan.

Procedure

Op het tijdstip van uw afspraak, meldt u zich op de afdeling Medische Beeldvorming (route 22). U wordt verzocht plaats te nemen in een wachtruimte waarna een laborant u binnenroept. Vervolgens wordt u gevraagd uw bovenkleding uit te trekken. Zittend op een stoel, wordt de betreffende borst op een plaat gelegd. Een gedeelte van de borst wordt vervolgens met behulp van een plastic plaatje aangedrukt. Dit aandrukken kan gevoelig zijn, het is daarom erg belangrijk dat u gedurende het onderzoek zo stil mogelijk blijft zitten en dat u zich zoveel mogelijk ontspant. De laborant maakt vervolgens röntgenfoto's van de borst. Hierna kan de computer de plaats van de afwijking bepalen. Met behulp van de computer bepaalt de radioloog de exacte positie voor het biopt. Voordat het biopt wordt afgenomen wordt de plaats op de borst verdoofd. De radioloog plaatst vervolgens de naald en controleert of deze op de juiste plaats zit. Vervolgens wordt met de naald weefsel verwijderd.

Het onderzoek vindt poliklinisch plaats. Dit wil zeggen dat u na het onderzoek gewoon naar huis kunt. De duur van het onderzoek is gemiddeld drie kwartier.

De uitslag

Voor de uitslag van het onderzoek komt u na ongeveer een week terug op de Mammapoli. De afspraak hiervoor krijgt u van de mammacare verpleegkundige.

Risico's en complicaties

Na deze ingreep is het mogelijk dat een bloeding optreedt op de plaats van de punctie. Ook bestaat er een kleine kans dat een infectie optreedt.

Pijn

De borst kan na het biopt, als de verdoving is uitgewerkt, nog pijnlijk zijn. Mocht u pijnklachten hebben dan mag u thuis paracetamol nemen, maximaal 4 x daags 2 tabletten (= 4 x1000 mg).

Wanneer moet u contact opnemen?

Het is belangrijk om bij roodheid, zwelling van de borst of koorts contact op te nemen met de mammacare verpleegkundige, via de Mammapoli.