

Duimbasis slijtage

Poli Orthopedie
Route 16

Poli Reumatologie
Route 76

R331.63 0111

1012990

Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
T. 0495 - 57 21 00
www.sjgweert.nl



Bij u is slijtage (arthrose) van de duimbasis vastgesteld. Deze folder geeft u uitleg over de aandoening en de behandelingsmogelijkheden.

De anatomie van de duim

De duim bestaat uit een tweetal kootjes (A). De duim scharniert (B) met het eerste middenhandsbeentje (C). Dit laatste beentje scharniert in het zadelvormige duimbasisgewricht (D) weer met de handwortelbeentjes (E). In het duimbasisgewricht kan de duim in vrijwel alle richtingen bewegen. Alle gewrichtjes zijn bekleed met een dun laagje glad kraakbeen. Indien het kraakbeen versleten of beschadigd (F) raakt kunnen de gewrichts oppervlakken steeds moeilijker langs elkaar glijden en kan het gewrichtje "uit de kom" schieten. Het bewegen wordt dan moeilijker en pijnlijker.

Wat is de oorzaak?

Bij het ouder worden verminderd de kwaliteit van het kraakbeen, en het kraakbeen slijt dan sneller af. Kraakbeen kan vroegtijdig worden aangetast door reuma of een ongeval. De aandoening komt vooral voor bij (huis)vrouwen. Bij zwaar duimbelastend werk is de kans op slijtage groter. Meestal is de oorzaak echter onduidelijk.



Wat zijn de klachten?

Veel voorkomende klachten zijn:

- zwelling aan de duimbasis.
- pijn in de duimuis bij knijpen of wringen.
- vermindering van kracht en/of beweeglijkheid.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Op grond van de klachten wordt de diagnose vaak al vermoed. Voor een juiste diagnose zijn alleen lichamelijk onderzoek en röntgenfoto's voldoende. Soms wordt bloedonderzoek gedaan om andere oorzaken uit te sluiten.

Welke behandelingen zijn mogelijk?

Gewrichts slijtage is een natuurlijk proces. Het geeft lang niet in alle gevallen pijn. Behandeling is alleen nodig indien er toenemende pijnklachten zijn. In het begin zijn alleen pijnstillers en het ontzien van de hand voldoende. Eventueel kunnen bandages (tape) of een afneembare rustspalk worden voorgeschreven. Bij terugkerende of ernstige klachten kan de arts injecties in het gewricht geven. Indien dit niet meer helpt kan een operatie zinvol zijn.

Heeft u nog vragen?

Heeft U na het lezen van deze folder nog vragen? Uw huisarts kan u meestal voldoende adviseren. Voor spoedeisende vragen kunt u tijdens kantooruren bellen naar de polikliniek.

Polikliniek Orthopedie: 0495 - 57 21 61.

Polikliniek Reumatologie: 0495 - 57 24 90 of

0475 - 38 21 97