

Na de operatie.

Direct na de operatie krijgt u een verband om de voet.

Hierna leert de fysiotherapeut u met krukken lopen. U mag dan op de platte voet of op de hiel steunen. De dag na de operatie gaat u naar huis.

Wat zijn de mogelijke complicaties van de operatie?

Complicaties komen bij deze operatie zelden voor. Bloedingen en/of een wondinfectie kunnen optreden.

Soms wordt een huidzenuwtje beschadigd, waardoor een doof gevoel in de teen kan optreden. Dit is meestal van tijdelijke aard.

Hoe verloopt het herstel na de operatie?

Na de operatie blijft de teen nog weken gevoelig. Het litteken op de voet kan nog enkele maanden pijnlijk blijven.

Het dragen van (strak) schoeisel is de eerste weken meestal niet goed mogelijk.

De nacontrole.

Er wordt een controle-afspraak voor de polikliniek gemaakt.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Uw huisarts kan u meestal voldoende adviseren.

Voor spoedeisende vragen kunt u tijdens kantooruren bellen naar de poli Orthopedie, telefoon: 0495 - 57 21 61.




Operatie aan een hallux valgus de Brandes methode

poli Orthopedie
Route 16

U wordt binnenkort geopereerd aan een hallux valgus (kromstand van de grote teen). Deze folder kan u helpen zich goed op deze operatie voor te bereiden.

Wat is een hallux valgus?

Een hallux valgus is een kromstand van de grote teen. Hierdoor gaat het bot aan de binnenzijde van de voet uitsteken. Vaak raakt ook de 2e teen bekneld.



Wat is de oorzaak?

Bij jonge mensen met een brede voorvoet (spreidvoet) kan een te smalle schoen de grote teen in een hoekstand drukken. Dit kan op den duur leiden tot een blijvende kromstand van deze teen. Ook kan dit ontstaan door "erfelijke aanleg". Bij oudere mensen treedt de kromstand op in combinatie met slijtage in het grote-teen gewricht.

Wat zijn de klachten?

De aandoening kan zowel aan één als aan beide voeten voorkomen. De klachten kunnen verschillend zijn.

Veel voorkomende klachten zijn:

- Pijn aan het uitstekende botstuk aan de basis van de grote teen.
- Pijnlijke eksterogen.
- Pijn tijdens het "afwikkelen" van de voet bij het lopen.

Hoe wordt de diagnose hallux valgus gesteld?

Voor een juiste diagnose is alleen lichamelijk onderzoek voldoende. Vaak wordt ook een röntgenfoto gemaakt om eventuele slijtage in het gewricht vast te kunnen stellen. De mate van slijtage bepaalt welke operatie voor u het beste is.

Hoe bereidt u zich voor?


Haal vóór uw ziekenhuisopname elleboogskrukken. U kunt deze o.a. lenen bij de Thuiszorgwinkels (neem een legitimatiebewijs mee). Het is belangrijk, dat u de krukken bij opname in het ziekenhuis meebrengt.

Hoe verloopt de operatie?


De operatie kan gebeuren onder algehele anesthesie (narcose) of onder regionale anesthesie. Bij regionale anesthesie, de zogenaamde "ruggeprik", worden alleen beide benen verdoofd. Op de poli Pré- operatieve screening bespreekt men met u welke verdoving voor u het beste is.

De arts heeft bij u slijtage in het gewricht vastgesteld (figuur 1).


Tijdens de operatie wordt het uitstekende botstuk verwijderd (zie A in figuur 2). Een deel van het eerste teenkootje wordt afgezaagd (zie B in figuur 2). Het gewrichtskapsel wordt als een "vervangend" scharnier tussen de botstukken gehecht (zie C in figuur 2). Hierna is de grote teen weer recht (figuur 3).



figuur 1



figuur 2



Figuur 3