

Weer thuis.

U kunt het beste in bed of op de bank gaan liggen. Leg uw arm altijd hoger dan uw hart om zwelling te voorkomen.

Blijf de eerste twee dagen thuis. Het is belangrijk, dat u zich strikt houdt aan de voorschriften uit de instructiefolder. Ook het regelmatig uitvoeren van de voorgeschreven oefeningen is van belang.

U mag de eerste week geen auto besturen!!

Hoe verloopt het herstel na de operatie?

De klachten zijn meestal niet direct weg, maar kunnen soms nog weken duren. In zeldzame gevallen kan het zelfs nog enkele maanden duren voordat de pijn helemaal weg is.

Ook het herstel van de kracht in de arm kan soms lang duren.

Fysiotherapie is meestal niet nodig.

De nacontrole.

Er wordt een controle-afspraak voor de polikliniek gemaakt.

De hechtingen worden na 7 tot 10 dagen verwijderd.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Uw huisarts kan u meestal voldoende adviseren.

Voor spoedeisende vragen kunt u tijdens kantooruren bellen naar de polikliniek.

Poli Chirurgie : 0495 - 57 22 76.

Poli Orthopedie: 0495 - 57 21 61.



Operatie aan een tennis-elleboog

(plaatselijke verdoving)

Poli Chirurgie

Poli Orthopedie

U wordt binnenkort behandeld aan een tennis-elleboog (het zogenaamde “epicondylitis lateralis syndroom”). Deze folder kan u helpen zich goed op deze operatie voor te bereiden.

Wat is een tennis-elleboog?

De onderarmspiers zitten vlak bij het elleboogsgewricht vast aan het bovenarmbeen. Een tennis-elleboog is een irritatie van de aanhechting van de spieren aan de buitenzijde van de elleboog. Dit veroorzaakt pijnklachten.

Wat is de oorzaak?

Een tennis-elleboog wordt veroorzaakt door overbelasting. Niet alleen tijdens het tennissen, maar na elke overbelasting kan deze aandoening ontstaan. Oorzaken zijn bijvoorbeeld zwaar handwerk, tillen van kinderen en poetswerk.

Wat zijn de klachten?

Een tennis-elleboog komt meestal maar aan één arm voor. De klachten kunnen erg verschillend zijn.

Veel voorkomende klachten zijn:

- een uitstralende pijn naar de onderarm, de vingers of de bovenarm.
- pijn bij druk op de elleboog.
- krachtsvermindering bij knijpen en wringen.
- nachtelijke pijn bij het strekken van de arm.

Hoe wordt de diagnose tennis-elleboog gesteld?

Op grond van beschrijving van de klachten wordt de diagnose vaak al vermoed. Alleen lichamelijk onderzoek is voldoende om een tennis-elleboog vast te stellen.

De aandoening is niet met een röntgenfoto of "scan" vast te stellen. Soms wordt toch een foto gemaakt om andere oorzaken uit te sluiten.

Bij het lichamelijk onderzoek worden testjes uitgevoerd waardoor extra druk op de aanhechtingsplaats ontstaat. Hierdoor kunnen de klachten tijdelijk toenemen.

Welke behandelingen zijn mogelijk?

Meestal wordt pas tot een operatie besloten, indien andere methoden niet helpen.

Deze methoden zijn:

- rust en medicijnen.
- speciale bandage.
- injecties.
- rust-gips.

Hoe bereidt u zich voor?

Zorg voor een extra kussen in bed of op de bank. Om zwelling te voorkomen is het belangrijk dat u na de ingreep uw arm hoger laat rusten.

Het is niet noodzakelijk dat u de dag van de operatie nuchter bent.

Na de ingreep mag u geen auto besturen. Laat u door iemand brengen en halen.

Hoe verloopt de operatie?

De ingreep zal onder plaatselijke verdoving plaatsvinden.

Om vergissingen te voorkomen, wordt op de te opereren arm een kruis gezet.

De ingreep zelf duurt ongeveer 15 minuten. Via een klein sneetje op de elleboog wordt de aanhechting van de spieren aan de buitenzijde van de elleboog losgemaakt. Hierdoor wordt de irritatie opgeheven en kan de aanhechting weer tot rust komen. De spieren groeien in de loop der tijd vanzelf weer vast.

Na de operatie.

Het is belangrijk, dat u uw arm de eerste dagen na de ingreep ontziet. Hiervoor krijgt U een draagdoek (mitella) om de arm. Om de elleboog zit een verband.

Na de operatie krijgt u van de arts uitleg over wat u wel en niet mag doen. Deze informatie krijgt u ook schriftelijk mee naar huis.

Wat zijn de mogelijke complicaties van de operatie?

Complicaties komen bij deze operatie zelden voor. Bloedingen en soms een wondinfectie kunnen optreden.

Naar huis.

U mag naar huis als u zich goed voelt.

Meestal valt de pijn na de operatie mee. Voor de zekerheid krijgt u bij het naar huis gaan pijnstillers mee.