

De tijd dat de pleister moet blijven zitten is afhankelijk van de plaats waar hij geplakt zit.

Als deze tijd voorbij is verwijdert de pijnverpleegkundige het verband of de folie.

De pleister wordt verwijderd en u krijgt gedurende 1 minuut een reinigende en tevens verkoelende gel op de behandelde plek. De huid wordt schoongemaakt met water en zeep, gedroogd en als u dat wenst, nagekoeld met een koude pakking.

Tijdens de behandeling kunt u irritatie van de huid ervaren. Dit kan vervelend aanvoelen, maar is geen ongewone reactie.

Na de behandeling

Na de behandeling kan de huid rood zijn, branderig en pijnlijk aanvoelen. Dit gevoel kan tot enkele dagen na de behandeling aanhouden.

Het behandelde gebied kan extra gevoelig zijn voor warmte of druk.

U mag thuis paracetamol innemen tegen de pijn. Lees goed de voorschriften op de verpakking van de paracetamol.

Zorg dat u een koude pakking in huis heeft om eventueel te koelen. Zo kunt u zelf voor verlichting van de pijnklachten zorgen (uitleg over het koelen krijgt u van de verpleegkundige).

U mag na de behandeling niet zelfstandig naar huis gaan. Zorg dat u iemand meeneemt die u naar huis kan brengen.

De werking

De werking van de Qutenza[®] huidpleister treedt gemiddeld binnen 7 tot 14 dagen op. Het is ook mogelijk dat de pijnklachten eerder wegtrekken. De pijnvermindering kan tot 3 maanden aanhouden.

De pijnverpleegkundige belt u 1 week na de behandeling op om te vragen hoe het met uw pijnklachten gaat. Na 2 weken belt ze u nogmaals.

Heeft u tussendoor vragen, neem dan zelf, telefonisch contact op met de pijnverpleegkundige.

Bijwerkingen

Ondanks dat de behandeling met de Qutenza[®] huidpleister zorgvuldig wordt uitgevoerd, bestaat altijd kans op geringe bijwerkingen.

Deze bijwerkingen kunnen zijn:

Een branderig gevoel, pijn, roodheid van de huid en jeuk op de behandelde plek. Deze klachten gaan vanzelf weer over en zijn meestal licht tot matig.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de pijnverpleegkundige op de Pijnpoli.

Telefoon: 0495 - 57 25 37.



Behandeling met Qutenza[®] huidpleister

Pijnpoli

Op de pijnpoli heeft uw arts met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden met een Qutenza[®] huidpleister. In deze folder vindt u informatie over de behandeling.

De huidpleister wordt gebruikt bij perifere neuropatische pijn. Dit wil zeggen dat de pijn ontstaat en in stand wordt gehouden door het zenuwstelsel (neuropatisch). De pijn bevindt zich aan de buitenzijde van het lichaam (perifeer). Bijvoorbeeld een litteken of letsel dat pijn doet of uitstralingspijn geeft, zenuwpijn na een amputatie, neurologische ziekten zoals multiple sclerose of na een beroerte, herpes zoster (gordelroos) en zenuwpijn door medicijnen die als bijwerking zenuwen beschadigen zoals chemotherapie bij kanker.

De Qutenza[®] huidpleister kan in combinatie met pijnstillende medicatie gebruikt worden. U hoeft deze dus niet te stoppen tijdens uw behandeling met de huidpleister.

Hoe werkt de Qutenza[®] huidpleister?

In de huidpleister zit een hoge concentratie Capsaïcine verwerkt. Capsaïcine is een stofje dat in hete pepers zit.

Capsaïcine wordt via de pleister door de huid heen opgenomen. Het activeert bepaalde pijnprikkelontvangers (nociceptoren) in de huid die zich dan terugtrekken, waardoor 3 maanden geen pijnprikkels meer worden doorgegeven aan het centrale zenuwstelsel. U ervaart hierdoor pijnvermindering.

Na 3 maanden hebben de nociceptoren zich weer hersteld, waardoor de pijn terug kan keren. Wanneer u tijdens deze 3 maanden duidelijk minder pijn heeft kan de behandeling herhaald worden.

De huidpleister mag NIET gebruikt worden als u:

- Bekend bent met een hoge bloeddruk die niet goed onder controle is.
- Bekend bent met Diabetes Mellitus (suikerziekte).
- Recent een hartinfarct heeft gehad.
- Zichtbare huidbeschadiging heeft op de plaats van de pijn.
- De pijn op het gezicht, boven de haarlijn of in de buurt van de slijmvliezen voelt.

Voorafgaand aan de behandeling

De datum en het tijdstip van de behandeling wordt met u afgesproken bij de afdeling Zorgplanning. Houdt er rekening mee dat de behandeling een hele ochtend of middag kan duren.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding, neem dan contact op met de Pijnpoli. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Allergieën

Bent u ergens allergisch voor, bijvoorbeeld voor latex, pleisters of huidontsmettingsmiddelen en u heeft dit nog niet doorgegeven tijdens het intakegesprek, waarschuw ons dan.

Nuchter zijn

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn.

De behandeling

Op de dag van de behandeling meldt u zich op het aangegeven tijdstip bij de Pijnpoli op route 35.

U mag geen sierraden, piercings, nagellak, make-up dragen. U mag vooraf ook geen bodylotion gebruiken.

Het te behandelen gebied mag niet geschoren worden. Wel mogen haartjes weggeknipt worden.

Zorg dat u gemakkelijk zittende kleding draagt zodat het te behandelen gebied goed bereikbaar is.

De pijnverpleegkundige legt in het kort uit wat er gaat gebeuren en vraagt hoeveel pijn u op dat moment heeft.

U verwijdert de kleding op het gebied waar de pleister komt.

De huid wordt gecontroleerd op beschadiging.

Om zo precies mogelijk het gebied te kunnen bepalen waar de pleister komt de zitten, zal de pijnspecialist in overleg met u dit gebied aftekenen.

Daarna smeert de pijnverpleegkundige een verdovende zalf op de afgetekende plek en iets rondom de tekening en dekt deze af met folie. Dit moet 1 uur intrekken.

Als het uur voorbij is wordt de folie verwijderd en de zalfresten weggehaald. De Qutenza[®] huidpleister wordt op maat geknipt en op het afgetekende en verdoofde gebied gelegd. Omdat de pleister zelf niet plakt, komt er folie of een verband overheen.