

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met de poli Urologie: 0495 – 57 24 8



Botox injectie bij overactieve blaas

Poli Urologie

R333.19 2011-02

1161551

Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
T. 0495 - 57 21 00
www.sjgweert.nl

Waarom behandelen

Uw behandelend arts heeft bij u de diagnose “overactieve blaas” gesteld. Dit betekent dat u vaak moet plassen en dat het plassen meestal vooraf gegaan wordt door hevige aandrang. Zelfs kan het zo zijn dat u af en toe de urine niet kunt ophouden. Hiervoor heeft u al verschillende behandelingen gehad met bijvoorbeeld medicijnen, bekkenbodemp therapie of blaasspoelingen. Als geen van deze behandelingen voldoende helpt kan de toediening van botuline-toxine (botox) uitkomst bieden.

Wat is botox?

Botuline-toxine is een medicinale stof ('gif') die de signaaloverdracht van zenuwvezels naar spieren onderbreekt. De werking van botox kunt u vergelijken met het doorknippen van de telefoonlijn bij u thuis: als de lijn wordt doorgeknipt kunt u geen telefoongesprek meer voeren. En in het geval van botox: als botox in een spier wordt gespoten kan die spier geen signaal meer ontvangen en wordt die spier daardoor verlamd. Botox wordt ook gebruikt voor de behandeling van een overactieve blaasspier. Het middel verlamt dan de spieren die voor het activeren van de blaas zorgen.

Voor de ingreep

Om huidbeschadigingen met als gevolg risico op een wondinfectie te voorkomen, wordt ten eerste afgeraden om vóór de ingreep de haren te verwijderen in het operatiegebied. Indien u regelmatig de haren verwijderd in het operatiegebied, dan mag u tot 7 dagen vóór de operatie géén haren verwijderen.

Mocht de specialist het alsnog nodig vinden om haren te verwijderen, dan zal dit plaatsvinden in het OK-complex.

Hoe wordt botox toegediend?

Voor het juiste effect moet botox direct in de blaasspier gespoten (geïnjecteerd) worden en wel op 25 plaatsen in de blaas. Hiervoor gebruikt de uroloog een lange injectienaald die door een blaaskijker (cystoscoop) op de juiste plaatsen wordt geprikt. Op elk van die 25 plaatsen wordt een zeer kleine hoeveelheid botox geïnjecteerd. Omdat de injecties pijnlijk kunnen zijn vindt de ingreep onder verdoving plaats. Op de poli Pre operatieve screening wordt bepaald of dit via een ruggenprik of algehele narcose gebeurt.

U verblijft voor deze behandeling een dag en nacht in het ziekenhuis.

U krijgt na de ingreep een blaaskatheter om de urine af te voeren. Deze wordt de volgende ochtend verwijderd. Als u spontaan geplast heeft kan u naar huis.

Wat kunt u van de ingreep verwachten?

De behandeling is effectief bij ongeveer 70 procent van de patiënten.

De behandeling geeft geen nare neveneffecten. Soms kan na injectie de urine iets bloederig zijn. Het effect van de behandeling is na ongeveer drie dagen te merken.

Helaas werkt botox maar drie tot zes -, soms tot twaalf maanden. Als het is uitgewerkt kan de behandeling herhaald worden.

Een ander nadeel is dat bij sommige patiënten de botox zó goed werkt dat zij enige tijd niet goed kunnen plassen en daarom zichzelf enkele malen per dag moeten katheteriseren. Patiënten die twifelen of ze dit zelfkatheteriseren wel aankunnen of aandurven, krijgen de mogelijkheid dit te leren vóór de ingreep wordt toegepast.

Voor de ingreep

Sommige medicijnen moeten voor de ingreep gestopt worden. Indien u Detrusitol, Vesicare, Emselex, Dridase of Kentera-pleisters gebruikt moet u deze 10 dagen voor de ingreep niet meer gebruiken.

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt dient u deze, in overleg met uw behandelend arts, 1 week voor de ingreep te stoppen.

Nazorg

Er is geen specifieke nazorg nodig. U mag na de ingreep weer uw normale activiteiten oppakken.

Bij pijnklachten mag u zonodig Paracetamol gebruiken.

Indien u thuis na de behandeling problemen of klachten heeft kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Urologie. Buiten kantoor tijden kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp, (0495) - 57 26 10 of de huisarts.

Na ongeveer 6 weken komt u terug op de poli voor controle.