

Wat te doen in geval van ziekte of verandering?

Als u door ziekte of andere redenen verhinderd bent de afspraak voor de ingreep of controle na te komen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de poli Urologie.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie.

Telefoon: 0495 - 57 24 80.



Circumcisie of besnijdenis bij kinderen

Poli Urologie
Route 25

R333.52 2008 -08

1013320

Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
T. 0495 - 57 21 00
www.sjgweert.nl

Uw zoon(tje) krijgt binnenkort een besnijdenis, ook wel circumcisie genoemd.

Deze informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. Deze algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Wanneer er nog vragen zijn of onduidelijkheden, kunt u contact opnemen met uw arts.

Wat is een besnijdenis of circumcisie?

Bij een circumcisie wordt de voorhuid van de penis geheel of gedeeltelijk verwijderd.

De meest voorkomende reden voor deze ingreep is een te nauwe voorhuid, wat problemen kan veroorzaken zoals moeilijkheden bij het plassen, of een ontsteking van de eikel of voorhuid.

Bepaalde godsdiensten schrijven besnijdenis van jongens voor. Ten slotte zijn er ouders die uit hygiënische overwegingen een besnijdenis wensen bij hun zoon.

Voorbereiding op de operatie

In het algemeen geschiedt de operatie in dagverpleging. Bij kinderen tot 16 jaar vindt de besnijdenis plaats onder algehele verdoving (narcose). U ontvangt ter informatie de folder: "Anesthesie bij kinderen".

Voor de operatie wordt er met u en uw zoontje een afspraak gemaakt op de polikliniek Pré operatieve screening. In de folder: "Niet langer dan 1 dag in het ziekenhuis" vindt u informatie hoe u uw kind kunt voorbereiden op de operatie.

Hoe verloopt de operatie?

Na de toediening van de narcose wordt de penis gedesinfecteerd, waarna de penis met steriele doeken wordt afgedekt.

De arts verwijdert de voorhuid of een gedeelte ervan en hecht de wond. Deze hechtingen zijn oplosbaar: zij verdwijnen vanzelf na ongeveer 7 dagen, en hoeven dus niet verwijderd te worden.

Na de operatie

Wanneer de operatie in dagbehandeling heeft plaatsgevonden, dan kan uw zoon(tje) nog dezelfde dag naar huis. Het is na deze ingreep gebruikelijk dat uw zoon(tje) eerst geplast moet hebben, voordat hij naar huis mag.

Basisregel van de wondbehandeling is het schoon en droog houden van het wondgebied. De eerste dagen na de operatie is het advies het verband te verwisselen na het plassen. Een tot twee dagen na de operatie mag uw zoon(tje) weer douchen. Na douchen of kort! baden is het verstandig de wond droog te deppen, niet wrijven, omdat de "kale" eikel erg gevoelig is.

Bij gebruik van een luier, deze wat vaker verwisselen.

Oudere kinderen bij voorkeur een ruim zittende onderbroek of boxershorts laten dragen.

Bij pijn mag uw zoon 3 tot 4 keer per dag een Paracetamol zetpil van 120 of 240 mg afhankelijk van de leeftijd.

De dag na de operatie kunt u uw kind weer zijn gang laten gaan. Uw zoontje kan beter (indien van toepassing) enkele dagen niet naar school gaan en de eerste drie weken niet fietsen, sporten of zwemmen.

Let op! Wanneer er een gedeeltelijke besnijdenis is gedaan bij uw zoon mag de voorhuid **niet teruggeschoven worden!** Dit doet de uroloog bij de eerste controle.

Wat zijn mogelijke complicaties bij een besnijdenis?

Eventuele complicaties bij deze operatie beperken zich bijna altijd tot de wond. Er kan een nabloeding optreden, wat u ziet aan bloederig verband of een bloeduitstorting onder een hechting. Soms geneest de wond niet goed, wat zich uit in een infectie of wondpus. In dat geval dient u de wond te laten controleren bij de huisarts of de uroloog.

De controle

Bij een volledige circumcisie is controle in het algemeen niet nodig daar de wond snel zal genezen binnen 2 à 3 weken. Vindt u controle toch nodig, dan gaat u naar uw huisarts of u maakt een afspraak bij de behandelend uroloog.

Bij een gedeeltelijke besnijdenis volgt een controle 3 weken na de operatie. U krijgt een afspraak mee.