

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Urologie, telefoonnummer 0495 - 57 24 80.



Operatieve behandeling van een niet ingedaalde testikel

Polikliniek Urologie
Route 25

R 333.53 2008-08

1013337

Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
T. 0495 - 57 21 00
www.sjgweert.nl

Deze folder kan u als ouder helpen uw kind goed voor te bereiden op de operatie.

De informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek met de uroloog. De algemene informatie is niet altijd afgestemd op iedere individuele situatie. Wanneer er nog vragen zijn of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de uroloog.

De niet ingedaalde testikel

De testikels (zaadballen) ontwikkelen zich bij jongetjes niet in de balzak maar in de buik. Ongeveer een maand voor de geboorte dalen de testikels via de lies tot in de balzak (scrotum). Normaal gesproken heeft een jongetje bij de geboorte dan ook beide zaadballen in zijn balzak.

Soms blijft indaling achterwege. Eén of beide zaadballen blijven dan in de buik of de lies zitten.

Op latere leeftijd kunnen hierdoor vruchtbaarheidsproblemen ontstaan. Een niet ingedaalde testikel heeft geen invloed op de seksuele functies.

Zijn de zaadballen in het tweede levensjaar nog niet ingedaald, dan is medisch ingrijpen wenselijk.

De voorbereiding

In het algemeen geschiedt de operatie in dagverpleging. De operatie vindt plaats onder algehele verdoving (narcose). U ontvangt ter informatie de folder: "Anesthesie bij kinderen".

Voor de operatie wordt er met u en uw zontje een afspraak gemaakt op de polikliniek Pré operatieve screening. In de folder: "Niet langer dan 1 dag in het ziekenhuis" vindt u informatie hoe u uw kind kunt voorbereiden op de operatie.

De operatie

De operatie die nodig is om een zaadbal in de balzak te brengen heet in vaktermen "orchidopexie". Het is een operatie die ongeveer 1 uur duurt.

Voor de narcose moet uw kind in een kapje blazen zodat het in slaap valt. Soms wordt er een prikje in de arm gegeven.

De uroloog maakt een sneetje in de lies en een sneetje in de balzak. Via de opening in de lies wordt de zaadbal opgezocht en vrijgemaakt. De bloedvaten en de zaadleider van de testikel worden ook vrijgemaakt van de omgevende weefsels. Hierdoor kan voldoende lengte verkregen worden om de testikel naar de balzak te brengen, waar deze wordt vastgezet.

Stelt de arts tijdens de operatie een liesbreukje vast, dan wordt dit meteen verholpen.

De huidwond in de lies en de balzak worden meestal met oplosbare hechtingen gesloten, deze hechtingen hoeven dus niet verwijderd te worden.

Mogelijke complicaties

Eventuele complicaties beperken zich bijna altijd tot de wondjes. Er kan een nabloeding optreden, die zich meestal uit in een bloeduitstorting onder de hechting. In de regel verdwijnt deze vanzelf en is behandeling niet nodig.

Soms treedt een wondgenezingsstoornis op in de vorm van een infectie. In de meeste gevallen moet dit door de huisarts of de uroloog behandeld worden met antibiotica.

Verder is het normaal dat de balzak na de operatie een beetje gezwollen is en er blauw-roodachtig uitziet.

Nazorg thuis

Thuis mag uw kind alléén water of appelsap drinken. Is uw kind niet misselijk dan mag het 's avonds wat licht voedsel zoals pap, bouillon, appelmoes, of puree gebruiken, geen koolzuurhoudende dranken. Zeker de eerste dag moet uw kind rustig aan doen, dus in bed of op de bank blijven liggen.

De dag na de operatie kunt u uw kind weer gewoon zijn gang laten gaan. Waarschijnlijk zal hij de eerste dagen minder actief zijn. Het verband kunt u de eerste twee dagen laten zitten, daarna mag dit verwijderd worden. Ook mag het kind weer onder de douche of "even" in bad. De wond na douche of bad droogdeppen. Eventuele luiers kunt u het beste wat vaker verwisselen.

Bij pijn mag uw kind een (kinder) Paracetamol zetpil, 120 mg of 240 mg (afhankelijk van de leeftijd).

Het is beter de eerste drie weken niet te sporten, gymnastiek te doen, te zwemmen of te fietsen. Indien uw kind voldoende fit is, kan het na een week weer naar school.

Controle

Op het afsprakenkaartje staat wanneer u met uw zontje ter controle komt bij de uroloog.

Wat te doen bij ziekte of bij verhindering?

De operatie van uw kind kan niet doorgaan als:

- uw kind op de ochtend van de ingreep een temperatuur heeft boven de 38°C. heeft.
- er in de omgeving besmettelijke ziekten voorkomen zoals mazelen, waterpokken, rode hond en bof.

Wij verzoeken u dit dan telefonisch door te geven aan het secretariaat van de polikliniek Urologie.