

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt bij het eerstvolgende poliklinisch bezoek met u besproken. Dit is ongeveer anderhalve tot 2 weken na de biopsie. De verpleegkundige maakt hiervoor een afspraak met u.

Problemen

Bij onvoorziene problemen, zoals aanhoudend bloedverlies en branderig gevoel met plassen, gepaard gaande met aanhoudende koorts (boven 38.5°C), verzoeken wij u contact op te nemen. Op werkdagen, tijdens kantooruren, kunt u contact opnemen met de poli Urologie. Buiten deze tijden met de Spoedeisende Hulp.

Telefoonnummers:

poli Urologie. 0495 – 57 24 80
afdeling Spoedeisende Hulp 0495 – 57 26 10

Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen heeft dan kunt u op werkdagen, tijdens kantooruren, contact opnemen met de poli Urologie.



Prostaatbiopsie

Poli Urologie

R333.17 2010-09

1170398

Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
T. 0495 - 57 21 00
www.sjgweert.nl

Wat is een prostaatbiopsie?

Een biopsie is een onderzoek, waarbij door middel van een prik, weefsel uit een orgaan kan worden verkregen. In geval van een prostaatbiopsie betreft het de prostaat (voorstanderklier), die onder de blaas en rondom de plasbuis vlak boven de kring-spier is gelegen. Het weefsel wordt door een holle naald (biopsienaald) opgezogen.

Omdat de darm minder gevoelig is voor een prik dan de huid, wordt de biopsie via het laatste gedeelte van de darm (de endeldarm) verricht. Een verdoving is dan niet noodzakelijk. Afhankelijk van eerdere onderzoeksresultaten worden 6 tot 12 biopten genomen. Hierna verliest u meestal wat bloed; niet alleen uit de endeldarm via de anus, maar ook uit de plasbuis, met de urine en bij de zaadlozing.

Het weefsel dat via een biopsie is verkregen, wordt voor microscopisch onderzoek naar het weefsella-boratorium gestuurd. Voordat het weefsel microscopisch kan worden onderzocht, moet het bewerkt worden. Na ongeveer een week kan de patholoog (degene die het weefsel onderzoekt) het weefsel beoordelen en stuurt hij zijn bevindingen naar de uroloog.

Vorbereiding

Vóór de biopsie mag u onderstaande bloedverdun-nende medicijnen gedurende 1 week niet meer innemen:

- Ascal (= carbasalaat calcium),
- Aspirine,
- Plavix,
- Marcoumar of
- Sintromitis

Deze middelen vergroten namelijk de kans op een ernstige nabloeding.

Voor het onderzoek mag u normaal eten en drin-ken.

Ter voorkoming van een infectie van de urinewegen start u 1 dag voordat de prostaatbiopsie plaatsvindt een korte antibioticakuur. Het recept hiervoor krijgt u van de arts.

Het onderzoek

Een kwartier voor het onderzoek wordt u op de afdeling Dagbehandeling (route 32) verwacht. Na een intake gesprek, brengt de verpleegkundige van de afdeling u per bed naar de poli Urologie. Voor het onderzoek vragen wij u, uw blaas leeg te plas-sen en daarna neemt u plaats op de onderzoeksta-fel. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug en uw benen liggen daarbij gespreid in beenhouders.

In eerste instantie tast de uroloog via de anus uw prostaat af. Daarna wordt (via de anus) de biopsie-naald ingebracht. Zodra de uroloog gaat prikken zal hij u waarschuwen. In het algemeen wordt de biopsie niet als pijnlijk ervaren.

Het onderzoek duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Echografische controle

Meestal vinden de prostaatbiopten plaats terwijl een echo wordt gemaakt. Bij deze methode wordt de biopsienaald tegelijk met de echografiebuis inge-bracht.

Na het onderzoek

Om vlekken in het ondergoed te voorkomen, krijgt u na het onderzoek van de verpleegkundige een beschermend verband.

Na de biopsie gaat u weer per bed naar de afdeling Dagbehandeling en volgt een observatie periode van ongeveer 2 uur, waarvan u het eerste uur bedrust moet houden. Daarna mag u het ziekenhuis verlaten. U mag niet zelf rijden, laat u door iemand ophalen.

Weer thuis

- In overleg met uw behandelend arts is met u afgesproken wanneer u weer met uw bloedver-dunnende medicijnen mag beginnen;
- Om een urineweginfectie tegen te gaan, maakt u de antibioticakuur af;
- U verliest meestal wat bloed bij de ontlasting, bij het plassen en/of via het sperma. Dit bloedverlies kan enkele dagen aanhouden. Het bloedverlies bij sperma kan enkele weken aanhouden. Om pro-blemen met plassen door stolselvorming te voor-komen adviseren wij u extra te drinken;
- Op de dag van de biopsie kunt u 's avonds koude rillingen en koorts krijgen. Deze koorts moet de volgende dag zijn verdwenen;
- De eerste 24 uur na de ingreep mag u niet fiet-sen. Daarnaast raden wij u aan de eerste dag na de ingreep zoveel mogelijk rust te houden.