

# **Ontsteking in de kaak/mondholte operatieve behandeling**

## **Kaakabces**

Poli Mondziekten, Kaak- en Aangezichts chirurgie

***Uw behandelend arts heeft bij u een ontsteking in de kaak/mondholte geconstateerd die operatief ontlast moet worden. De operatie zelf vindt plaats in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De nacontroles zijn in SJG Weert.***

***In deze folder kunt u nog eens nalezen wat na afloop van de behandeling belangrijk voor u is. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.***

## **De behandeling**

Op de operatiekamer wordt onder algehele narcose de ontsteking ontlast door middel van een klein sneetje. Na deze ingreep blijft vaak een slangetje (drain) achter in het wondgebied. De wond wordt via deze drain meerdere malen per dag gespoeld. Via het infuus krijgt u indien nodig antibiotica toegediend.

## **Na de behandeling**

U komt na de behandeling op de verpleegafdeling. U blijft opgenomen in het ziekenhuis zolang u nog antibiotica via het infuus krijgt en u nog een drain in het wondgebied heeft. Vaak is er ook sprake van zwelling, die grotendeels verdwenen moet zijn voor u naar huis kunt. De kaakchirurg bepaalt het moment dat u naar huis gaat.

De pijnklachten verdwijnen meestal binnen enkele dagen. U kunt de pijn bestrijden met paracetamol 500 mg (maximaal 6 per dag), tenzij de kaakchirurg u een ander pijnstillend middel heeft voorgeschreven.

## **Mondverzorging**

Voor een goede wondgenezing is het belangrijk dat u uw mond vanaf de dag na de behandeling goed schoonhoudt. Dit bereikt u door uw kiezen en tanden goed te poetsen. Poets na elke maaltijd en s avonds voordat u gaat slapen. Daarnaast wordt geadviseerd uw mond na het poetsen te spoelen met chloorhexidine 0,2%. Hiermee start u 24 uur na de operatie. (Als bijwerking kan zijn een zwarte verkleuring van de tanden en de tong ontstaan, dit gaat vanzelf weg als u stopt met de spoeling). Als u naar huis gaat krijgt u hiervoor een recept mee.

## **Wat u verder moet weten**

- Gebruik geen alcohol in combinatie met medicatie. Alcohol verhoogt de kans op wondcomplicaties en vertraagd de genezing.
- Roken heeft een nadelige invloed op de wondgenezing.
- Pas op met hete dranken (zoals thee) en warm voedsel tijdens de dag van de behandeling. Hierdoor kunnen nabloedingen optreden.
- Als u na de ingreep moeite heeft met eten, adviseren wij u de eerste dagen vloeibaar en zacht voedsel te gebruiken. Daarna kunt u geleidelijk het normale etenspatroon weer oppakken.
- Het hangt af van de pijn en het ongemak, wanneer u weer kunt gaan werken.

## **Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis**

Het spreekt vanzelf dat de arts alles doet om de kans op complicaties zo klein mogelijk te maken. Toch bestaat er altijd een kleine kans op een nabloeding of een wondinfectie.

U kunt contact opnemen met de poli Mondziekten, Kaak- en Aangezichts chirurgie als:

- de pijn, zwelling en slikklachten na twee dagen niet verminderen, of
- als er sprake is van koorts (boven de 39° C).

Poli Mondziekten, Kaak- en Aangezichts chirurgie,  
Bereikbaar op werkdagen van 08:15 – 16:30 uur.  
Telefoon: 0495 – 57 28 64.

**Voor een afspraak** (bellen tussen 08:30 – 16:30 uur),  
telefoon: 0495 – 57 28 60

Overige tijden met de afdeling Spoedeisende Hulp  
telefoon: 0495 – 57 26 10.

## **Heeft u nog vragen?**

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u die gerust stellen aan uw behandelend arts en/of de verpleegkundige van de afdeling.

R6366.05

2015-12

1185310

