

De uitslag

De longarts die het onderzoek gedaan heeft kan enkel zeggen of er iets abnormaals gezien is, tijdens het onderzoek. Mogelijk worden er nog aanvullende onderzoeken aangevraagd.

Als er weefselstukjes of kweken zijn genomen, duurt het ongeveer vijf werkdagen voordat de uitslag bekend is.

Er wordt met u afgesproken wanneer u de uitslag van de diverse onderzoeken krijgt.

Risico's en mogelijke complicaties

Het bronchoscopisch onderzoek is over het algemeen een veilig onderzoek dat geen pijn doet.

Kleine bloedingen in de luchtwegen zijn mogelijk; de kans is echter zeer klein. Met medicijnen die tijdens het onderzoek kunnen worden toegediend kan een eventuele bloeding beperkt en zelfs gestopt worden.

Verhinderd?

Als u verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de poli Longgeneeskunde. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:

afdeling Longfunctie, telefoon: 0495 - 57 21 94 of poli Longgeneeskunde, telefoon: 0495 - 57 21 90.



Bronchoscopie

Poli Longgeneeskunde

U wordt voor het onderzoek verwacht op het Dagcentrum (route 32) op:

Datum:

Tijd:

Waarom een bronchoscopie?

Dit onderzoek wordt gedaan om de luchtwegen van binnen te kunnen bekijken. Zo kan men vaststellen of er afwijkingen zijn. Ook kan men eventuele ontstekingen zien. Indien nodig kan er slijm of weefsel worden weggenomen voor nader onderzoek in het laboratorium.

Voor het onderzoek

Het is belangrijk dat u voor het onderzoek nuchter bent. U mag daarom vanaf 24:00 uur (middernacht) niet meer eten, drinken of roken.

Gebruikt u medicijnen dan moet u die na overleg met de longarts innemen. (Gebruikt u bloedverdunnende middelen of medicijnen bij suikerziekte dan moet u vooraf met de longarts overleggen of u deze mag gebruiken voor het onderzoek.

Het is belangrijk dat u eventuele inhalatie-medicijnen (pufjes) voor het onderzoek wel gebruikt zoals u gewend bent.

Als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of verdoving is het belangrijk dat u dit meldt aan de longarts.

Draag tijdens het onderzoek gemakkelijke kleding. U hoeft geen nachtgoed, pantoffels, ochtendjas en toiletartikelen mee te nemen.

Bezoek voor het onderzoek eventueel het toilet (in verband met hoesten).

Indien u een gebitsprothese draagt, moet u deze tijdens het onderzoek uitdoen.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op het Dagcentrum (route 32).

Na een kort gesprekje wordt u naar de behandelkamer begeleid. U hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank.

Om te voorkomen dat u tijdens het onderzoek gaat hoesten of kokhalzen, wordt uw keel en luchtwegen met een spray verdoofd. Hiervoor besproeit de arts de binnenkant van mond en keel met een vloeistof. De spray heeft in het begin een wat bittere smaak. Dit verdoven is niet pijnlijk. Net als bij de tandarts krijgt u het gevoel dat uw keel zwelt. Dit is enkel een gevoel, uw keel blijft open en u kunt gewoon ademen.

Daarna wordt uw luchtpijp verdoofd.

De arts schuift de bronchoscoop (een dun, flexibel slangetje) via de mond tot in de luchtwegen. Doordat deze verdoofd zijn voelt u hier nauwelijks iets van.

De bronchoscoop is maar enkele millimeters dik en sluit de luchtweg dus niet af, u kunt gewoon doorademen.

Soms wordt er door de neus extra zuurstof toegediend, voornamelijk als u het gevoel heeft benauwd te zijn.

Tijdens het onderzoek wordt hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed gecontroleerd via een klemmetje om uw vinger.

Het gehele onderzoek, inclusief de voorbereidingen, duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u weer naar het Dagcentrum gebracht. Hier controleert de verpleegkundige nog enkele malen het zuurstofgehalte in uw bloed via een klemmetje op uw vinger.

Als de controles goed blijven en u zich verder goed voelt mag u, na 30 minuten tot 1 uur, naar huis.

Eet en drink niets - tot 2 uur na het beëindigen van het onderzoek. Deze tijd is noodzakelijk voor het laten uitwerken van de verdoving van de keel en luchtwegen. Het gevaar bestaat immers dat u zich anders gaat verslikken, en voedsel in de luchtwegen terecht kan komen.

Neem na 2 uur wachten, voorzichtig een slokje water. Lukt het drinken zonder te hoesten dan kunt u weer gewoon eten en drinken.

De mogelijkheid bestaat dat u na het onderzoek wat bloed ophoest. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer er tijdens het onderzoek wat weefsel is afgenomen voor onderzoek. Normaliter stopt dit bloedverlies spontaan en ook het wondje geneest snel.

Mocht het bloed opgeven echter blijven aanhouden of toenemen, neem dan contact op met de poli Longgeneeskunde.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, telefoon: 0495 - 57 26 10.

U kunt na afloop ook een gevoeliger keel hebben, dit verdwijnt vanzelf in de loop van de dag.

Het wordt afgeraden na het onderzoek zelf per auto naar huis te rijden.