

### Verhinderd?

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Longfunctie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

### Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Longfunctie.

Telefoon: 0495 - 57 21 94



# Huidallergie-test

Longfunctieafdeling  
Route 60

**U wordt verwacht voor een huidallergie-test**

**Dag:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_

**Tijd:** \_\_\_\_\_

R321.48 2011-01

1099911

Vogelsbleek 5  
6001 BE Weert  
T. 0495 - 57 21 00  
[www.sjgweert.nl](http://www.sjgweert.nl)

## Waarom een huidallergie-test?

Een huidallergie-test kan aantonen of u voor bepaalde stoffen allergisch bent en in welke mate.

Er kunnen namelijk luchtwegklachten optreden zodra u (meestal via de luchtwegen) in contact komt met stoffen waarvoor u overgevoelig bent.

## De voorbereiding

Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn.

We adviseren u de ochtend van het onderzoek geen bodylotion of crème aan te brengen op beide onderarmen.

Verder zijn er geen speciale voorbereidingen.

## Het onderzoek

Een 20-tal stoffen waarvan men vermoedt dat ze een allergische reactie kunnen opwekken worden op de huid van de onderarm gedruppeld. Met behulp van een steriel naaldje wordt door de druppel in de huid geprikt. U voelt een licht pijnlijk prikje op het moment dat het naaldje de huid raakt.

Na het aanprikken van de druppels, moeten de teststoffen 15 minuten inwerken. Daarna wordt de grootte van een mogelijke reactie gemeten. Een reactie op een bepaalde stof is positief, indien er een klein bultje verschijnt, vergelijkbaar met een muggenbult.

De gehele huidallergie-test duurt ongeveer een half uur.

## Bijwerkingen

Na 6 tot 8 uur, doch binnen de 24 uur, kan een late huidreactie optreden. Deze zal zich dan doorgaans uiten als roodheid met jeuk op de prikplaats. Meestal zal dit spontaan weer verdwijnen. Indien zich heftige bijwerkingen voordoen, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts.

## Medicatie tijdelijk stoppen

Voor het goed slagen van de test, dient men tijdelijk vóór het onderzoek, te stoppen met de inname van bepaalde medicatie. Deze medicijnen kunnen namelijk de onderzoeksresultaten beïnvloeden.

Het kan dus zijn dat u bepaalde medicijnen een aantal dagen vóór het onderzoek niet mag innemen. De arts of longfunctieanalist zal aangeven wat voor u van toepassing is.

## 1 week vóór het onderzoek niet meer innemen:

- Aerius
- Allerfree
- Benylin
- Brontine
- Claratine
- Hismanal
- Hydroxozine
- Incidallette
- Multergan
- Nedeltran
- Phenergan
- Polaramine
- Polaronil
- Semprex
- Tavegil
- Telfast
- Terfenadine
- Toplexil
- Xyzal
- Zaditen
- Zyrtec