

Hyperventilatie onderzoek

Longfunctieafdeling

R321.46 2013-11

1099943

Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
T. 0495 - 57 21 00
www.sjgweert.nl

Hyperventilatie-onderzoek

Via een hyperventilatie-onderzoek kan worden vastgesteld of de klachten die u heeft, veroorzaakt worden door hyperventilatie, d.w.z. door een verkeerde manier van ademen. Deze klachten worden wellicht herkend tijdens de uitvoering van het onderzoek.

De voorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn en er is geen speciale voorbereiding noodzakelijk.

Uw, eventuele, medicatie moet u gewoon doorgebruiken.

Voor de aanvang van de test, neemt u samen met de longfunctieanalist een vragenlijstje door, om uw huidige klachten in kaart te brengen.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit u in een stoel en ademt u door een mondstuk in en uit.

Het mondstuk is verbonden met een apparaat dat registreert hoe snel en hoe vaak u per minuut ademt en hoeveel koolzuur u uitademt.

Ook krijgt u een neusklem op, om te voorkomen dat u door uw neus ademt.

Na een periode van rustig ademen, zal de analist u vervolgens vragen om in een aangegeven tempo, gedurende 3 minuten snel in en uit te ademen.

Na een rustpauze van 5 minuten, wordt opnieuw een vragenlijst met u doorgenomen, om na te gaan, of de klachten die u thuis had, nu ook tijdens de test zijn opgetreden.

Verhinderd?

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Longfunctie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Longfunctie.

Telefoon: 0495 - 57 21 94.