

# Pleurapunctie

Longfunctieafdeling

R321.50 2013-11

1099982

Vogelsbleek 5  
6001 BE Weert  
T. 0495 - 57 21 00  
[www.sjgweert.nl](http://www.sjgweert.nl)

## Pleurapunctie

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een pleurapunctie. Bij een pleurapunctie wordt vocht dat rond de long zit met behulp van een naald weggehaald. In deze folder wordt de gang van zaken bij dit onderzoek in grote lijnen beschreven.

## Algemeen

De longen zijn omgeven door twee vliezen, waartussen zich vocht kan ophopen. Dit kan leiden tot diverse klachten. De aanwezigheid van vocht wordt aangetoond door lichamelijk onderzoek en door het maken van een röntgenfoto van de borstkas. Via een prikje in de borstholte zal de arts proberen wat van dat vocht, dat op de foto tussen de longvliezen te zien is, af te nemen voor nader onderzoek.

Soms kan tussen deze longvliezen zelfs zoveel vocht zitten, dat de long hierdoor in verdrukking wordt gebracht en er bijgevolg kortademigheid kan optreden.

De prik, waarbij geprobeerd wordt deze vochtophoping weg te nemen heet "ontlastende punctie".

## De voorbereiding

U hoeft voor deze ingreep niet nuchter te zijn. Gebruikt u echter bloedverdunnende middelen zoals Sintrom-mitis of Marcoumar, meldt dit dan vooraf aan uw arts.

## Het onderzoek

Meestal wordt het onderzoek uitgevoerd terwijl u rechtop zit. Als u te ziek of te zwak bent kan de arts proberen het onderzoek te doen terwijl u in bed ligt.

U wordt gevraagd om op de rand van uw bed te gaan zitten met de voeten ondersteund door een bankje of op een kruk en uw bovenkleding uit te trekken.

De arts zoekt de plaats op waar het meeste vocht zit door op de borstkas te kloppen en markeert deze plaats. De huid wordt gedesinfecteerd met een vloeistof zonder jodium. De huid en het longvlies wordt met een injectie met een dunne naald plaatselijk verdoofd of wordt via deze naald wat vocht afgenomen. Dit voelt aan als een gewone 'bloedprik' en wordt als licht pijnlijk ervaren. Het verdere onderzoek is door de verdooving pijnloos, hoewel een hoestprikkel kan ontstaan.

De longarts staat meestal aan uw rugzijde en brengt een naaldje in, tussen twee ribben, tot in de holte tussen de twee longbladen (pleuraholte). Op de punctienaald zit een spuit, waarmee het vocht wordt opgezogen. Het zo verkregen pleura-vocht wordt opgestuurd voor verder onderzoek.

De ingreep duurt ongeveer 5-10 minuten. Een ontlastende punctie duurt langer, omdat er meer vocht wordt afgenomen.

Op het wondje wordt een pleister gedaan, die na een uurtje verwijderd mag worden.

Het is verstandig om het gedurende een half uurtje na het onderzoek rustig aan te doen.

Afhankelijk van wat uw arts aangeeft, wordt nog een röntgenfoto gemaakt om het effect van de pleurapunctie goed te kunnen beoordelen.

## Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Longfunctie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

## Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Longfunctie.

Telefoon: 0495 - 57 21 94