

U kunt beter geen Salazopyrine gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn komt ook in de moedermelk terecht. Overleg met uw reumatoloog.

Aanvullende informatie

- Als u duif of duizelig bent, wees dan voorzichtig in het verkeer. U kunt beter niet zelf autorijden.
- Wees voorzichtig met alcoholgebruik. In combinatie met Salazopyrine heeft u een grotere kans op maagklachten. Neem daarom niet meer dan één alcoholconsumptie per dag.
- Bewaar geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen.
- Als u tabletten overhoudt, lever deze dan in bij de apotheek.

Vragen

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw reumatoloog:

Tijdens kantooruren:
Poli Reumatologie:
telefoon: 0495 - 57 24 90

Buiten kantooruren en in het weekend: de huisartsenpost. De huisarts kan contact opnemen met de dienstdoende reumatoloog.



Salazopyrine

Sulfasalazine

Medicatie

Poli Reumatologie

In deze folder geven wij u uitleg over de werking, het gebruik en bijwerkingen van Salazopyrine. Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u daarmee altijd bij de arts terecht.

Lees ook de bijsluiter van dit medicijn.

Werkking

Met medicijnen is de oorzaak van een reumatische aandoening niet weg te nemen. Wel zijn er medicijnen die de klachten zoals pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten kunnen verminderen. Salazopyrine is zo'n medicijn. Het werkt ontstekingsremmend, onder meer in de gewrichten.

Gebruik

Het kan 2 tot 3 maanden duren voordat u merkt dat Salazopyrine begint te werken. Als u pijnstillers gebruikt kunt u deze blijven gebruiken. Helaas heeft dit middel niet bij iedereen een gunstig effect. Als het bij u niet werkt of als u teveel last heeft van bijwerkingen, kan de reumatoloog besluiten het gebruik hiervan te stoppen.

Over het algemeen kunt u Salazopyrine in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Er zijn enkele medicijnen, zoals sommige antibiotica en ijzertabletten, die de werking van Salazopyrine beïnvloeden.

Ook kan Salazopyrine de werking van bloedverdunners van de trombosedienst, zoals Sintrom(mitis) en Marcoumar, beïnvloeden.

Dit geldt ook voor de combinatie van sulfasalazine met digoxine (harttabletten), foliumzuur en tabletten bij diabetes mellitus.

Vertel uw huisarts, specialist en de trombosedienst daarom altijd welke geneesmiddelen u gebruikt. Zorg voor een actueel medicatieoverzicht. Dit is te krijgen bij uw apotheek.

Wijze van innemen

Salazopyrine is een geneesmiddel in de vorm van tabletten van 500 mg. Deze worden meestal volgens een opbouwschema geslikt.

	Ochtend	Avond
Week 1	1 tablet	
Week 2	2 tabletten	
Week 3	2 tabletten	1 tablet
Week 4	2 tabletten	2 tabletten

U kunt de tabletten het beste innemen tijdens de maaltijd, dus met voedsel, water of melk. Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt of kauwt maar in zijn geheel doorslikt.

Mogelijke bijwerkingen

- Misselijkheid, hoofdpijn of duizeligheid, soms duifheid.
- Huiduitslag.
- Ontstekingen van het mondslijmvlies, zoals pijnlijke plekjes.
- Erge keelpijn in combinatie met koorts, regelmatig terugkerende bloedneuzen en snel optreden van blauwe plekken. Dit kan wijzen op een stoornis in de bloedaanmaak.
- Verandering van stemming.
- De urine kan oranje-rood kleuren. Dit is onschuldig en gaat vanzelf over als u de tabletten niet meer slikt.
- In sommige gevallen stoornissen in de werking van de lever. Hier merkt u niets van.

Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij:

- huiduitslag;
- ontstekingen van het mondslijmvlies;
- erge keelpijn in combinatie met koorts;
- regelmatig terugkerende bloedneuzen;
- snel optreden van blauwe plekken.

Als u veel last heeft van bijwerkingen kunt u stoppen met het gebruik van Salazopyrine. Noteer dan wel op welke dag u gestopt bent en waarom. Neem bij twijfel contact op met uw reumatoloog.

Controles

Om eventuele stoornissen in de werking van de lever en de aanmaak van het bloed in een vroeg stadium te ontdekken, laat uw reumatoloog regelmatig uw bloed controleren. Bij het starten van Salazopyrine vindt gedurende de eerste 3 maanden iedere 4 weken bloedcontrole plaats. Daarna 1 x per 3 maanden. Werk goed mee aan deze controles om het medicijn veilig te gebruiken.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Salazopyrine heeft geen invloed op de vruchtbaarheid van vrouwen. Bij mannen kan het een tijdelijke onvruchtbaarheid veroorzaken. Dit herstelt zich weer enkele maanden nadat het middel niet meer wordt gebruikt.

Hoewel Salazopyrine waarschijnlijk veilig is voor het ongeboren kind, is het verstandig met uw reumatoloog te overleggen als u een zwangerschap overweegt of al zwanger bent.